

Druh	Seti						Retacelem	N hnojení (v kg/ha)			Neodstranitelné příměsi		Vyžaduje ošetřování proti škodlivým činiteľům	poznámky
	krycí plodina	hloubka v cm	výsevok v kg/ha	do uváleného povrchu	letní výsev do	válení po zasetí		v létě po sklizni krycí plodiny	podzim	JARO 1. užít. roku	kulturní druhy	plevela)***		
bojinek luční	možná	do 2 cm	15	ano	15.VIII	ano		30	30	80	BC, lipnice	laskavec ohn.	výkainice	
bojinek cibulkatý	možná	1 až 2	10 až 12	ano	31.VII	ano		30	40	40	Bl. Lipnice	laskavec ohn.	výkainice	
jilek hybr. a Bečva	ne	3 až 4	25	ne				0	40 - 60	50 - 90	jilek mn.	pýr		
jilek jednoletý	ne	3 až 4	25	ne				0	0	80 - 100		pýr		umísťovat na vybrané pozemky a nestřídat jiné druhy trav
jilek mnohokvětý	ne	3 až 4	25	ne				0	40 - 60	60 - 80		pýr		
jilek vytrvalý 2n	(ne)	2 až 3	25 až 30	ne				20 - 30	40	40 - 80	kostřavy	pýr		vypadavý
jilek vytr. 4n a Lofa	ne	2 až 3	18 až 20	ne				40 - 60		50 - 90	kostřavy	pýr		vypadavý
kostřava červená	ano	1 až 2	25	ano	15.VII		ano	30	40	40 - 50)*	srha, kostř.	pýr, heřmánky	béloklasost	
kostř. červená trav.	ano	1 až 2	12 až 15	ano	15.VII		ano	40	30	40 - 50)*	srha, kostř.	pýr, heřmánky	béloklasost	
kostřava luční	ano	2 až 3	22	ne	30.VI			15 - 30	25	50	srha, jilky	pýr, sveřepy		vypadavá
kostř. rákosovitá	ano	2 až 3	15 až 16	ne	15.VII			40	30	50 - 80	srha, jilky	pýr		
lipnice luční	ano	povrch	12	ano		ano		30	40	70 - 90	lipnice, psin.	1.roční, chundelka, heřmánek, hluchavka	béloklasost námel	
lipnice bahenní	ano	povrch	12	ano		ano		30	30	50 - 70	lipnice, psin.	1.roční, chundelka, heřmánek, hluchavka	béloklasost námel	
ovsík vyvýšený	možná	2 až 3	20	ne			ano	40	40 - 50	(10 - 25)**	jilky, kostř.	pýr, sveřepy		velmi vypadavý
psárka luční	možná	do 1 cm	14 až 17	ano		ano		20 - 30	40	40	troštit, ovsík	lip.roč., psárka rolní		vypadavá
psineček obrovský	ano	povrch	7 až 8	ano		ano		40	40	30)*	psin. tenký	1.roční, chundelka	béloklasost	
psineček tenký	ano	povrch	6 až 7	ano		ano		30	30	40 - 50	psin. obr.	1.roční, chundelka	béloklasost	
RH jilkovitý Perun	ne	3 až 4	25	ne	30.VI			30 - 40	30	50 - 90	jilek mn., kostř.	pýr		
RH kostřavovitá	ano	2 až 3	15 až 18	ne	15.VII			30 - 40	40	60 - 80	srha, jilky	pýr	béloklasost	
srha říznáčka I hajní	možná	2 až 3	20	možné	15.VII			40	30 - 40	40 - 50	kostřavy	pýr		
troštit žlutavý	ano	povrch	10 až 15	ano		ano	ano	30	30	50)*	lipnice, psin.	1.roční, chundelka	béloklasost	velmi vypadavý
jetele luční	možná	1 až 2	10 až (13)	ano	15.VII						jetele, vojtěška	knotovky a šílenky, svízel přibula, ježatka kulř noha a báry	nosatčici	

)* další přihnojení močovinou současně s Retacelem, dávka dle stavu porostu

)** přihnojení v užítkovém roce pouze formou postřiku močovinou současně s Retacelem

)*** ve všech porostech trav a jetele se nesmí vyskytovat šřovik tupolistý a kadefavý, v mnohých je neodstranitelnou příměsí