

Semenářství trav a jetele lučního

Druh	Setí						Retaceř
	krycí plodina	hloubka v cm	výsevek v kg/ha	do uválenéh o povrchu	letní výsev do	válení do setí	
bojínek luční	možná	do 2 cm	15	ano	15.VIII	ano	
jílek hybr.a Bečva	ne	3 až 4	25	ne			
jílek jednoletý	ne	3 až 4	25	ne			
jílek mnohokvětý	ne	3 až 4	25	ne			
jílek vytvralý 2n	(ne)	2 až 3	25 až 30	ne			
jílek vytr. 4n a Lofa	ne	2 až 3	18 až 20	ne			
kostřava červená	ano	1 až 2	25	ano	15.VIII		ano
kostř.červená tráv.	ano	1 až 2	12 až 15	ano	16.VII		ano
kostřava luční	ano	2 až 3	22	ne	30.VI.		
kostř.rákosovitá	ano	2 až 3	15 až 16	ne	15.VII.		
lipnice luční	ano	povrch	12	ano		ano	
lipnice bahenní	ano	povrch	12	ano		ano	
ovsík vyvýšený	možná	2 až 3	20	ne			ano
psárka luční	možná	do 1 cm	14 až 17	ano		ano	
psineček tenký	ano	povrch	5 až 7	ano		ano	
RH jílkovitý Perun	ne	3 až 4	25	ne	30.VI.		
RH kostřavovité	ano	2 až 3	15 až 16	ne	15.VII		
srha říznačka I hajní	možná	2 až 3	20	možná	15.VII		
trojštět žlutavý	ano	povrch	10 až 15	ano		ano	ano
jetel luční	možná	1 až 2	10 až (13)	ano	15.VII		

N hnojení (v kg/ha)			Neodstanitelné příměsi		Vyžaduje ošetřování proti škodlivým činitelům	Poznámky
v létě po sklizni krycí plodiny	podzim	jaro 1. užit.roku	kulturní druhy	plavela)***		
30	30	80	BC, lipnica	laskavec ohn.	výkalnice	
0	40 - 60	50 - 80	jílek mn.	pýr		umísťovat na vybrané pozemky a nestřídat jiné druhy trav
0	0	80 - 100		pýr		
0	40 - 60	60 - 80		pýr		
20 - 30	40	40 - 80	kostřavy	pýr		vypadavý
40 - 60		50 - 90	kostřavy	pýr		vypadavý
30	40	40 - 50)*	srha, kostř.	pýr, heřmánky	běloklasost	
40	30	40 - 50)*	srha, kostř.	pýr, heřmánky	běloklasost	
15 - 30	25	50	srha, jílky	pýr, sveřepy		vypadává
40	30	50 - 80	srha, jílky	pýr		
30	40	70 - 90	lipnice, psín.	I.roční, chundelka, heřmánek, hluchavka	běloklasost náměl	
30	30	50 - 70	lipnice, psín.	I.roční, chundelka, heřmánek, hluchavka	y	
40	40 - 50	(10 25)**	jílky, kostř.	pýr, sveřepy		velmi vypadavý
20 - 30	40	40	troštět, ovsík	lip.roč., psárka roční		vypadává
30	30	40 - 50	paln.obr.	I.roční, chundelka	běloklasost	
30 - 40	30	50 - 90	jílek mn.kostř.	pýr		
30 - 40	40	60 - 80	srha, jílky	pýr	běloklasost	
40	30 - 40	40 - 50	kostřavy	pýr		
30	30	50)*	lipnice, psln.	I.roční, chundelka	běloklasost	velmi vypadavý
			jetele, vojtěška	knotovky, svízel přítula, ježatka kuří noha a béry	nosatčící	

-)* další přihnojení močovinou současně s Retacelem, dávka dle stavu porostu
 přihnojení v užitkovém roce pouze formou postřiku močoviny
)** současně s Retacelem
 ve všech porostech trav a jetele se nesmí vyskytovat štokovité tupolistý a kadeřavý, v mnohých je neodstranitelnou příměsí
)***